



Pathologie de l'abeille Demande d'analyse et renseignement client

Siège social : Rue des écoles-64150 Lagor - Tel : 05 59 60 23 85 - fax : 05 96 60 74 47
Site de Tarbes : Centre Kennedy-Rue E. Aldrin-65000 Tarbes cedex-Tel:05 62 56 71 65-fax: 05 62 56 71 66
Site de Mt de Marsan : 1 rue Marcel David - BP 219 - 40004 Mont de Marsan cedex Tél : 05.58.06.08.08 -Fax : 05.58.06.15.47

BIV/FC49 version 03-01/06/2015

Client : résultat <input type="checkbox"/> payeur <input type="checkbox"/> Nom : Adresse	Tiers : résultat <input type="checkbox"/> payeur <input type="checkbox"/> Nom : Adresse
Prescripteur : résultat <input type="checkbox"/> payeur <input type="checkbox"/> Nom : Adresse	Acheminement : Client <input type="checkbox"/> Laboratoire <input type="checkbox"/> Autre :

Problèmes suspectés :

OBSERVATIONS complémentaires:

Types d'analyse demandée (cocher la ou les case (s) correspondante (s))

Loque Américaine (couvain/larves/miel/cire) <input type="checkbox"/>	Paralyse chronique,maladie noire (CBPV) (abeilles/larves) <input type="checkbox"/>
Loque Européenne (couvain/larves/miel/cire) <input type="checkbox"/>	Virus paralysie aigue (ABPV) (abeilles/larves) <input type="checkbox"/>
Nosébose (<i>Nosema apis</i> , <i>Nosema ceranae</i>) (abeilles/miel/cire) <input type="checkbox"/>	Virus du couvain sacciforme (SBV) (abeilles/larves) <input type="checkbox"/>
Acariose des trachées (abeilles) <input type="checkbox"/>	Virus des ailes déformées (DWV) (abeilles/larves) <input type="checkbox"/>
Varroase (couvain/abeilles) <input type="checkbox"/>	Virus israélien de la paralysie aigue (IAPV) (abeilles/larves) <input type="checkbox"/>
Mycose (couvain) <input type="checkbox"/>	Virus de la cellule royale noire (BQCV) (abeilles/larves) <input type="checkbox"/>
Aethina tumida (abeilles/cages à reine) <input type="checkbox"/>	Virus du Cachemire (KBV) (abeilles/larves) <input type="checkbox"/>
Tropilaelaps (abeilles/cages à reine) <input type="checkbox"/>	

Types de prélèvements

Rucher	Identification : Numéro ou nom de l'échantillon	Type d'échantillon :	Information complémentaire

Date de prélèvement :

Signature :



Pathologie de l'abeille Demande d'analyse et renseignement client

Siège social : Rue des écoles-64150 Lagor - Tel : 05 59 60 23 85 - fax : 05 96 60 74 47
Site de Tarbes : Centre Kennedy-Rue E. Aldrin-65000 Tarbes cedex-Tel:05 62 56 71 65-fax: 05 62 56 71 66
Site de Mt de Marsan : 1 rue Marcel David - BP 219 - 40004 Mont de Marsan cedex Tél : 05.58.06.08.08 -Fax : 05.58.06.15.47

BIV/FC49 version 03-01/06/2015

PRÉLÈVEMENTS À EFFECTUER selon les symptômes observés :

Matrices	Abeilles	« Symptomatiques » : prélever prioritairement les abeilles vivantes présentant les signes cliniques ou comportements anormaux qui motivent cette demande d'analyse (une trentaine d'abeilles minimum est nécessaire).
		Internes : Ce prélèvement est moins fiable que les autres pour la recherche des maladies de l'abeille adulte. En présence de signes cliniques ou comportements anormaux, ce prélèvement doit impérativement être accompagné d'un prélèvement d'abeilles présentant ces symptômes.
		Mortes : Attention à l'état du prélèvement si les abeilles sont desséchées ou putréfiées l'analyse ne sera pas réalisable. Prélever les abeilles mortes <u>récemment</u> (depuis maximum 1 semaine) et en dehors des périodes de pluie. En présence de comportements anormaux, le prélèvement d'abeilles mortes doit impérativement être accompagné d'un prélèvement d'abeilles « symptomatiques » de la même colonie.
Couvain		Découper un morceau de couvain contenant 15 larves et/ou nymphes dont l'aspect anormal motive cette demande d'analyse.

CONDITIONNEMENT

Mettre les prélèvements dans des conditionnements propres et fermés portant le numéro ou le nom de l'échantillon tels que :

- des emballages en carton (ex : boîte d'allumettes) ou en papier (attention à éviter tout risque d'écrasement),
- des cages à reines (lors d'envoi d'abeilles vivantes avec du sucre candi),

CONSERVATION ET ENVOI DES ÉCHANTILLONS :

- **Si l'envoi peut se faire dans les heures ou le jour qui suit le prélèvement** : s'il s'agit d'abeilles mortes mettre les échantillons au réfrigérateur (attention ils doivent rester secs) et les expédier à température ambiante. Lors d'envoi d'abeilles vivantes (en cages à reines) les garder à température ambiante.
- **Dans le cas ou l'envoi ne peut pas se faire rapidement** : congeler les échantillons (-20°C) et veiller à ce que la chaîne du froid ne soit pas interrompue jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Utiliser des blocs « froids » congelés et une boîte isotherme.
- **Eviter les envois en fin de semaine** (après mercredi), les prélèvements resteraient à la poste tout le week-end et l'analyse ne serait plus fiable.
- Les prélèvements doivent être envoyés au laboratoire dans un **colis rigide** afin d'**éviter tout risque d'écrasement**
- La **fiche de renseignement** remplie doit être **impérativement jointe aux prélèvements**.

TARIFS ***

Loques A et E (microscopie optique)*	17.40 €/loque	Acariose**/Varroase*	11.60 € /parasite
Loques A et E (mise en culture)**	17.40 €/loque	Mycose*	12.56 €
Identification Loque A et/ou E par RT-PCR*	46.13 €/loque	Aethina tumida/Tropilaelaps*	17.40 €
Nosérose (microscopie optique)*	17.40 €	CBPV (détection et quantification par PCR tps réel) *	103 €
Identification Nosema apis/cerenae par RT-PCR*	57.22 €	ABPV/SBV/DWV/IAPV/BQCV/KBV par RT-PCR*	46.13€/virus

*selon LNR - **selon OIE - ***Tarif dégressif selon le nombre d'échantillon et de virus, n'hésitez pas à demander un devis.